

## **PROFILAXIS TRABAJADORES DE HOSPITAL VIRGEN DE LA LUZ. CUENCA. VIH.**

### **Servicio de Prevención. Unidad de Vigilancia de la Salud. Consensuado con la Comisión de Infecciosas del Hospital Virgen de la Luz.**

Los recientes adelantos de la investigación han permitido mejorar substancialmente los conocimientos del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y la patogénesis del síndrome de la inmunodeficiencia. Con el advenimiento de herramientas sensibles para supervisar la replicación del VIH en las que puede evaluarse el riesgo de progresión de la enfermedad y muerte con precisión y se ve directamente la eficacia de los tratamiento frente al virus.

### **ACTUACIONES A REALIZAR EN PERIODO MENOR DE 6 HORAS DESDE EL ACCIDENTE BIOLÓGICO:**

#### **A) CLASIFICACION DEL TIPO DE ACCIDENTE BIOLÓGICO**

1º PASO: Clasificación del tipo de Inoculación

2º PASO: Clasificación del paciente fuente



#### **B) PROFILAXIS POSTEXPOSICION Y TIPO DE FARMACOS**

#### **C) CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL ACCIDENTE BIOLÓGICO.**


## A) CLASIFICACION DEL TIPO DE ACCIDENTE BIOLÓGICO

### 1º PASO: CLASIFICACION DEL TIPO DE INOCULACION

¿La fuente de infección es sangre, líquido sanguinolento, semen, secreción vaginal, líquido cefalorraquídeo, peritoneal, sinovial, pericardio, amniótico o tejido.



## 2º PASO: CLASIFICACION DEL PACIENTE FUENTE.



1º La fuente se considera VIH negativa cuando existe una prueba de laboratorio documentada que evidencia la negatividad de la muestra en torno al momento de la exposición.

2º Se considera positiva cuando existe positividad de laboratorio o diagnóstico clínico de SIDA.

3º En los casos dudosos se considerara positivo hasta que el resultado del seguimiento sea negativo

## **B) PROFILAXIS POSTEXPOSICIÓN Y FARMACOS UTILIZADOS**

<b>2º FUENTE</b>	<b>CLASE 1</b>	<b>CLASE 2</b>	<b>Fuente desconocida</b>	<b>VIH negativo</b>
<b>1º Tipo Exposición</b>				
<b>RIESGO BAJO MODERADO</b>	Recomendar La PPE con 2os fármacos	Recomendada La PPE con 3 Fármacos	Considerar la PPE con 2 fármacos en fuentes, con prácticas de riesgo	No recomendada
<b>RIESGO ELEVADO</b>	Recomendar la PPE con 2 Fármacos	Recomendada con 3 fármacos	Considerar la PPE con 2 fármacos	No recomendada

## **FARMACOS UTILIZADOS:**

### **A) TERAPIA CON DOS FARMACOS:**

1º COMBIVIR ( Zidovudina+ Lamiduvina) 1/ 12 horas / 4 semanas.

### **B) TERAPIA CON TRES FARMACOS.**

1º COMBIVIR 1/12 horas + SUSTIVA 600 1/ 24 H/ Toma por la noche ./ 4 semanas

2º Si el trabajador tiene historia clínica de alteraciones psiquiátricas se sustituye el SUSTIVA por KALETRA 3c/ 12 horas / 4 semanas.

## **NORMAS DE DISPENSACION DE TRATAMIENTO**

**Dias Laborales de 8.30-14.30 horas: Servicio de Prevencion. 1ª PLANTA FRENTE QUIROFANO.**

**Dias No Laborales y Dias laborales apartir de 14.30: Servicio Urgencias. (Acudirá al Servicio de Prevención al siguiente día laborable)**

## **C) CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL ACCIDENTE BIOLÓGICO.**

1º El Accidentado será enviado a la Unidad de Vigilancia de la Salud del Servicio de Prevención, para valoración del tratamiento establecido, control y seguimiento del trabajador.

2º En los primeros siete días, el paciente será remitido a la Unidad de Enfermedades Infecciosas, con carácter preferente para establecer unos criterios de actuación conjuntos con la Unidad de Vigilancia de la Salud